biodinâmica
respeto por usted

INFORMACIÓN TÉCNICA

CE 0120

ATTAQUE GEL
Ácido Ortofosfórico 37%

.

PRESENTACIÓN:
40x3x3g jeringas **ATTAQUE GEL** Bulk;
40 puntas aplicadoras;
o
3x3g jeringas **ATTAQUE GEL**;
1 punta aplicadora;
o
2x3g jeringas **ATTAQUE GEL**;
1 punta aplicadora.
Reg. ANVISA: 10298550087

COMPOSICIÓN:
Ácido Ortofosfórico 37%; espesante; metilparabeno; colorante azul (CI52015) y agua deionizada.

INDICACIÓN:
Para acondicionamiento ácido de la dentina y/o esmalte, proporcionando mejor retención de los materiales resinosos utilizados en restauraciones, fijación, cementación y sellamiento.

INFORMACIÓN TÉCNICA:
El ácido ortofosfórico 37% es utilizado durante 15 a 30 segundos y es el medio más eficiente para atacar esmalte y/o la dentina. Su uso en dentina promueve la remoción rápida y total del "*smear layer*", con consecuente abertura de las extremidades de los tubos, permitiendo que la resina penetre más fácilmente; y al facto del calcio y los iones fosfatos presentes en la dentina y en los fluidos dentinarios sean capaces de combinarse con el ácido ortofosfórico, neutralizando su efecto tóxico sobre la dentina. Promueve con eso, un incremento de la retención micromecánica y disminuí la microinfiltración marginal.
El colorante del **ATTAQUE GEL** permite una perfecta visualización del área a ser acondicionada, evitando que sean acondicionadas áreas donde no se desea este efecto. Su forma gel auxilia su aplicación, se limitando solamente a las áreas indicadas.

INSTRUCCIONES DE USO:
1. Después de la profilaxis con piedra pómez, lavar y secar el preparo. El uso de aislamiento absoluto es indicado;
2. Aplicar **ATAQUE GEL** en toda la extensión donde se desea el acondicionamiento y esperar por 15 segundos (dentina) y 30 segundos (esmalte);
Atención: Las cavidades más profundas deben ser protegidas con hidróxido de calcio o cemento de ionómero de vidrio antes del uso de **ATTAQUE GEL**. Los dientes fluorados pueden necesitar de una segunda aplicación;
3. Lavar con mucha agua el área acondicionada, por 30 segundos;
4. Secar la cavidad, teniendo el cuidado de no deshidratar la dentina.

CUIDADOS ESPECIALES:

Evitar el contacto directo de ATTAQUE GEL con la piel o mucosas. En caso de contacto, lavar abundantemente la región afectada con agua.

Después del uso, retire la presión tirando el émbolo para tras.
No ingerir.

CARACTERÍSTICAS / PROPIEDADES:

- ✓ Colorante azul para perfecta visualización en la aplicación y remoción;
- ✓ Viscosidad adecuada, no presenta desagüe para áreas indeseables;
- ✓ Exento de sílice - No deja resquicios de sílice, que impide la penetración del primer;
- ✓ Soluble en agua, facilidad de ser removido después del acondicionamiento.

CONTRAINDICACIÓN:
ATTAQUE GEL es contraindicado para personas con reportada sensibilidad a alguno de los componentes del producto.

BIBLIOGRAFÍA:

- ✓ REGIANINI e col., L. G; Condicionamento dentinário – www.odontologia.com.br.;
- ✓ SÁ, F. C. de; Avaliação da Efetividade de agentes condicionadores ácidos em diferentes tempos de observação com ou sem contaminação pela saliva – Bauru – 1993.