30001096 06.18-B

# GI-MASK Automix New Formula

## Gebrauchsinformation — DE

**Definition**
GI-MASK Automix *New Formula* ist eine mittelfliessende, thixotrope und standfeste Dentalabformmasse auf A-Silikonbasis mit automatischer Mischvorrichtung für die Erstellung von extraoralen Zahnfleischmasken im Dentallabor.

**Materialtyp**
Polyvinylsiloxan, additionsvernetzendes Silikon.
Basis: rosa
Katalysator: weiss
ISO 4823, Typ 2, medium body consistency.

**Anwendungsgebiete**
- Schnelle und genaue Rekonstruktion des gesamten Gingivaverlaufes im Präparationsbereich auf dem Meistermodell, insbesondere bei Einzelkronen, Brücken, Implantaten, Kombinations- und Teleskop-Arbeiten.
- Bei der Implantatrekonstruktion ermöglicht die besondere Viskosität ein schnelles direktes Umspritzen der Modellanaloge. Die Herstellung eines Silikonschlüssels (z.B. aus Coltène® Lab-Putty) ist somit nicht notwendig.
- Vorgehen bei Polyäthertränkung: Anwendung nur mit der beschriebenen indirekten Technik, siehe „Anwendung 1: Indirekte Technik". Für die direkte Technik ist Coltène Gi-Mask C-Silikon, Art.Nr. 8030

**Klinische Arbeitszeiten**

**≥ 9:00 min (bei 23 °C / 73 °F)**

**Gegenanzeigen**
Das Material ist nicht für die Herstellung von Epithesen zugelassen.

**Nebenwirkungen**
Polyvinylsiloxane weisen eine sehr gute biologische Verträglichkeit auf. Bis jetzt sind keine schädlichen Nebenwirkungen beim Anwender bekannt.

**Wechselwirkungen**
Hautsekretionen, Latex-Handschuhe und von Latex-Handschuhen kontaminierte Oberflächen können den Aushärtungsverlauf von Polyvinylsiloxanen beeinflussen. Ebenso können eugenolhaltige und gewisse bluststillende Präparate eine verlängerte Aushärtung verhindern.

**Mischen und Applizieren von GI-MASK Automix *New Formula***
1. Die Kartusche mit GI-MASK Automix *New Formula* in die geöffnete Fixierklappe des Mischgerätes einsetzen und Fixierklappe wieder schliessen.
2. Den Sicherheitsdeckel der Kartusche entfernen.
3. Den Druckgriff betätigen und etwas Material auf ein Papiertuch auspressen bis Basis und Katalysator gleichmäßig aus der Öffnung austreten.
4. Die Kassette/Mischspirale mit einem Tuch abtrocknen.
5. Die Mischdüse (Mixing Tip) auf die Kartuschenöffnung aufsetzen und durch eine ¼ Drehung im Uhrzeigersinn fixieren.
6. Den Applikationsknopf (Oral Tip) auf die Mischdüse aufsetzen.
7. Durch gleichmäßiges Betätigen des Druckgriffes das Material auspressen.
8. Nach Gebrauch die Mischdüse nicht entfernen. Sie dient als Verschluss bis zur nächsten Verwendung und verhindert eine Kontamination des Materials.
9. Vor erneutem Gebrauch Mischdüse entfernen und durch neue ersetzen.

**Anwendung 1: Indirekte Technik**
1. Einen Silikonschlüssel (z.B. aus Coltène® Lab-Putty) erstellen, der alle zu reproduzierenden Bereiche des ungespaßten Modells abdeckt.
2. Die Bereiche des Meistermodells, die durch GI-MASK Automix *New Formula* wiedergeben werden sollen, mit einer Gipsfräse reduzieren.
3. Im palatinalen/lingualen Bereich des Silikonschlüssels eine oder mehrere Einspritzöffnungen anbringen. Um eine Erhöhung der Zahnfleischmasse zu vermeiden, zusätzlich Auslaufkanäle im labialen/labialen Bereich anbringen.
Es ist wichtig, dass sich dies Löcher im präparierten Bereich befinden.
4. Den vorbereiteten Schlüssel mit GI-MASK Universal Separator gleichmäßig besprühen und an der Luft mindestens 5 min trocknen.
5. Anschließend auf das gesägte und beschliffene Modell aufsetzen und fixieren.
6. GI-MASK Automix *New Formula* mit der Mischdüse und aufgesetztem Applikationsknopf beim ersten Loch (z.B. palatinal/lingual) in den Schlüssel einspritzen bis beim entgegengesetzten Loch (bukkal) wieder Material austritt. Beim zweiten Loch (palatinal/lingual) fortfahren, usw.
7. GI-MASK Automix *New Formula* ab Mischbeginn für min. 9 min aushärten lassen. Sobald GI-MASK Automix *New Formula* ausgehärtet ist, kann der Schlüssel vom Modell gelöst werden.
8. Die Retentionen im Bereich der Ein- und Ausflußkanäle mit einem Skalpell durchtrennen und GI-MASK Automix *New Formula* vorsichtig entfernen. Löcher, Überschüsse und Presspfahnen mit einer feinen Schere, einem Skalpell oder rotierenden Instrumenten bearbeiten, z.B. Fräser für Silikone, Art.Nr. 8075) mit niedriger Drehzahl entfernen.
9. Die Zahnfleischmaske kann nun einfach vom Meistermodell entfernt und wieder reponiert werden.

**Anwendung 2: Direkte Technik**
1. Die Abformung nach Vorgaben des Herstellers reinigen und desinfizieren.
2. Die gesamte Abformung gleichmäßig mit GI-MASK Universal Separator besprühen und an der Luft mindestens 5 min trocknen.
3. GI-MASK Automix *New Formula* direkt in die Abformung einspritzen. Über den Applikationsknopf wird GI-MASK Automix *New Formula* in die Modellanalage (Implantatkopf) – ca. 2 mm – eingepreßt.
Only supplied to dentists and dental laboratories or upon their instructions.

**Caution**
Federal law restricts this device to sale by or on the order of a dentist.

**Date of issue**
06-2018

## Mode d'emploi — FR

**Définition**
GI-MASK Automix *New Formula* est un produit pour empreinte dentaire de viscosité moyenne, thixotropique et stable, à base de silicone de type A, conditionné en cartouche pour la création de masques gingivaux au laboratoire de prothèse dentaire.

**Type de matériau**
Polyvinylsiloxane, silicone par addition.
Base: rose
Catalyseur: blanc
ISO 4823, Type 2, medium body consistency.

**Indications**
- Reconstruction rapide et précise du contour gingival complet autour de la préparation sur le modèle maître, en particulier pour les couronnes unitaires, les bridges, les implants, les prothèses combinées et télescopiques.
- Pour la technique d'implant, la viscosité spécifique permet de surmouler rapidement et directement les analogues. Cela évite de créer une clef en silicone (par ex Coltène® Lab-Putty).
- Pour les empreintes réalisées à l'aide de polyéthers, merci de vous référer aux indications fournies à la rubrique "Application 1: technique indirecte". Pour la technique directe, merci d'utiliser Coltène Gi-Mask C-Silicone, ref. 8030.

**Temps de travail clinique**

**≥ 9:00 min (23 °C / 73 °F)**




**Contre-indications**
Ce matériau n'est pas agréé pour la fabrication d'épithèses.

**Effets secondaires**
Les polyvinylsiloxanes ont une très bonne compatibilité biologique. A la date d'aujourd'hui, aucun effet secondaire ou indésirable pour l'utilisateur n'est connu.

**Interactions**
Les sécrétions cutanées, les gants en latex et les surfaces contaminées par les gants en latex peuvent influencer le processus de durcissement des polyvinylsiloxanes. De même, les préparations contenant de l'eugénol et certaines préparations à effet hémostatique peuvent empêcher un durcissement complet.

**Mélange et application de GI-MASK Automix *New Formula***
1. Après avoir ouvert la plaque de retenue du distributeur Coltène® de 50 / 75 ml, y introduire la cartouche de GI-MASK Automix *New Formula* et refermer la plaque.
2. Enlever le couvercle de sécurité de la cartouche.
3. Activer le poussoir et presser un peu de matériau sur une serviette en paper jusqu'à ce que la base et le catalyseur sortent de l'ouverture de façon homogène.
4. Essuyer l'ouverture de la cartouche avec une serviette en papier.
5. Placer la buse mélangeuse (Mixing Tip) sur l'ouverture de la cartouche et la fixer en faisant ¼ de tour dans le sens horaire.
6. Placer l'embout applicateur (Oral Tip) sur la buse mélangeuse.
7. Pulse e distribuite l'impronta secondo le istruzioni del produttore.
8. Ne pas enlever la buse mélangeuse après utilisation. Elle sert à obturer la cartouche jusqu'à la prochaine utilisation et empêche une contamination du matériau.
9. Avant une nouvelle utilisation, enlever la buse mélangeuse et la remplacer par une buse neuve.

**Utilisation 1 : Technique indirecte**
1. Créer une clef en silicone (par ex. en Coltène® Lab-Putty) qui recouvrira toutes les zones à reproduire du modèle non scié.
2. Réduire avec une fraise les zones du modèle maître à reproduire avec GI-MASK Automix *New Formula*.
3. Faire un ou plusieurs trous d'injection dans la zone palatine/linguale de la clef en silicone. Pour éviter que la masse gingival n'augmente de volume, faire en plus des canaux d'écoulement dans la zone buccale/labiale. Il est important que les trous soient dans la zone préparée.
4. Pulvériser GI-Mask Universal Separator en une couche régulière sur toute la surface de la clé préparée (par exemple avec Coltène Lab-Putty). Laisser sécher pendant au moins 5 minutes.
5. Positionner ensuite le modèle scié et meulé et le fixer.
6. Injecter GI-MASK Automix *New Formula* avec la buse mélangeuse et l'embout applicateur dans la clef du premier trou (par ex. palatin/lingual) jusqu'à ce que le matériau sorte par le trou adjacent (buccal). Procéder de même pour le second trou (palatin/lingual) et les autres trous éventuels.
7. GI-Mask Automix *New Formula* polymérise en à peu près 9 minutes à partir du début du mélange.
Dès que GI-MASK Automix *New Formula* a durci, séparer soigneusement la clef du modèle.
8. Détacher avec un scalpel les rétentions situées dans la zone des canaux d'arrivée et d'écoulement et séparer GI-MASK Automix *New Formula* de la clef.
9. Eliminer les excès avec de fins ciseaux, un bistouri ou un instrument rotatif spécialement conçu (par exemple le Trimmer pour silicones, ref. 8075).
10. Après quoi, retirer le masque gingival du modèle maître et le remettre en place.

**Utilisation 2 : Technique directe**
1. Nettoyer et désinfecter l'empreinte conformément aux indications du fabricant.
2. Pulvériser GI-Mask Universal Separator en une couche régulière sur toute la surface de l'empreinte. Laisser sécher pendant au moins 5 minutes. Injecter GI-MASK Automix *New Formula* directement dans l'empreinte.
3. Injecter GI-MASK Automix *New Formula* directement dans l'empreinte. En utilisant l'embout applicateur, injecter le produit autour des analogues (en implantologie) à environ 5 mm de hauteur.
4. Attendre environ 9 minutes à partir du début du mélange que GI-MASK Automix *New Formula* soit polymérisé.
5. Verser ensuite du plâtre dans l'empreinte.
6. Après durcissement, détacher soigneusement l'empreinte du modèle.
7. Eliminer les excès avec de fins ciseaux, un bistouri ou un instrument rotatif spécialement conçu (par exemple le Trimmer pour silicones, ref. 8075).
Il est alors possible de retirer le masque gingival du modèle maître et de le remettre en place.

**Tipo de material**
Polivinilsiloxano, silicona de polimerización por adición.
Base: rosa
Catalizador: blanco
ISO 4823, Tipo 2, medium body consistency.

**Indicaciones**
- Reconstrucción rápida y precisa del contorno completo de la encía alrededor de la preparación en el maestro. Resulta particularmente adecuado para coronas unitarias, puentes, implantes, trabajos combinados y telescópicos.
- En rehabilitaciones con implantes, el material puede aplicarse directamente alrededor del análogo del modelo de forma rápida gracias a su viscosidad específica. Esto hace que no sea necesario elaborar una llave de silicona (p.ej. con Coltène® Lab-Putty).
- Para impresiones de polieter: indicación con la técnica indirecta descrita en "Aplicación 1: técnica indirecta". Para la técnica directa use Coltène Gi-MASK C-Silikon, n.º de art. 8030.

**Tiempos clínicos**

**≥ 9:00 min (23 °C / 73 °F)**




**Controindicazioni**
Il materiale non può essere utilizzato per la realizzazione di epitesi.

**Effetti collaterali**
Il polivinilsiloxano presenta un'eccellente biocompatibilità. Ad oggi non sono noti effetti collaterali nocivi per l'utilizzatore.

**Interazioni**
Le secrezioni cutanee, i guanti in lattice e le superfici o contaminate da questo tipo di guanti possono interferire con il processo d'indurimento dei polivinilsiloxani. Anche i composti contenenti eugenolo e certi preparati emostatici possono impedire l'indurimento.

**Miscelazione e applicazione di GI-MASK Automix *New Formula***
1. Inserire la cartuccia con GI-MASK Automix *New Formula* nel dispenser Coltène® da 50 / 75 ml.
2. Togliere il coperchio di protezione della cartuccia.
3. Premere l'impugnatura e fare uscire una piccola quantità di base e catalizzatore su un panno di carta fino a ottenere un flusso unico omogeneo.
4. Pulire l'apertura della cartuccia con un panno.
5. Posizionare il puntale per la miscelazione (Mixing Tip) sull'apertura della cartuccia e bloccarlo ruotando in senso orario di ¼ di giro.
6. Inserire la punta per applicazione (oral tip) sul puntale.
7. Fare fuoriuscire il materiale premendo sull'impugnatura.
8. Non rimuovere il puntale dopo l'uso. Esso funge infatti da chiusura fino alla successiva applicazione, impedendo la contaminazione del materiale.
9. Togliere il puntale di miscelazione e sostituirlo con uno nuovo prima di riutilizzare il dispositivo.

**Applicazione 1: Tecnica indiretta**
1. Realizzare una mascherina in silicone (ad.es. in Lab-Putty Coltène®) che copra tutti i settori riproducibili del modello.
2. Con una fresa per gesso ridurre i settori del modello master da riprodurre con GI-MASK Automix *New Formula*.
3. Praticare uno o più fori d'iniezione nella regione palatale/linguale della mascherina in silicone. Eseguire anche alcuni canali di sfogo nella regione boccale/labiale. È importante che i fori si trovino nell'area preparata.
4. Spruzzare uniformemente GI-MASK Universal Separator sull'intera superficie della mascherina preparata (ad es. Lab-Putty Coltene) e asciugare per almeno 5 minuti.
5. Quindi posizionare e bloccare sul modello.
6. Iniettare la pasta GI-MASK Automix *New Formula* nella mascherina, utilizzando il puntale di miscelazione. Continuare l'applicazione fino a fuoriuscita, partendo dal primo foro (ad es. palatale/linguale), fino a fare fuoriuscire il materiale dal foro opposto (boccale). Proseguire con il secondo foro (palatale/linguale), e così via.
7. GI-MASK Automix *New Formula* indurisce in circa 9 minuti dall'inizio della miscelazione. Non appena GI-MASK Automix *New Formula* è indurita, è possibile rimuovere la mascherina dal modello.
8. Utilizzando un bisturi, separare le ritenzioni nella zona dei canali d'ingresso e uscita, quindi separare la pasta GI-MASK Automix *New Formula* dalla mascherina.
9. Eliminare l'eventuale materiale in eccesso con forbicine, bisturi o strumento rotante per siliconi (ad es. rifinitore per siliconi, art. n° 8075).
10. A questo punto è possibile rimuovere con facilità la mascherina gengivale dal modello master e riposizionarla.

**Applicazione 2: Tecnica diretta**
1. Pulire e disinfettare l'impronta secondo le istruzioni del produttore.
2. Spruzzare uniformemente GI-MASK Universal Separator sull'intera impronta e asciugarla ad aria per almeno 5 minuti.
3. Iniettare GI-MASK Automix *New Formula* direttamente nell'impronta. In implantologia, applicare con gli appositi puntali il materiale per circa 5mm in altezza attorno agli analoghi.
4. Attendere l'indurimento di GI-MASK Automix *New Formula* (circa 9 minuti dall'inizio della miscelazione).
5. Successivamente colare l'impronta con gesso di IV classe.
6. Dopo l'indurimento, rimuovere con precauzione l'impronta dal modello.
7. Eliminare l'eventuale materiale in eccesso con forbicine, bisturi o strumento rotante per siliconi (ad es. rifinitore per siliconi, art. n° 8075).
8. A questo punto è possibile rimuovere con facilità la mascherina gengivale dal modello master e riposizionarla.

## Instrucciones de uso — ES

**Definición**
GI-MASK Automix *New Formula* es un material dental tixotrópico para impresiones, de viscosidad media y dimensionalmente estable, basado en una silicona de tipo A. Está previsto para su empleo con un dispositivo mezclador automático para la elaboración de máscaras gingivales extraorales en laboratorios de prótesis dental.

**Tipo de material**
Polivinilsiloxano, silicona de polimerización por adición.
Base: rosa
Catalizador: blanco
ISO 4823, Tipo 2, medium body consistency.

**Indicaciones**
- Reconstrucción rápida y precisa del contorno completo de la encía alrededor de la preparación en el maestro. Resulta particularmente adecuado para coronas unitarias, puentes, implantes, trabajos combinados y telescópicos.
- En rehabilitaciones con implantes, el material puede aplicarse directamente alrededor del análogo del modelo de forma rápida gracias a su viscosidad específica. Esto hace que no sea necesario elaborar una llave de silicona (p.ej. con Coltène® Lab-Putty).
- Para impresiones de polieter: indicación con la técnica indirecta descrita en "Aplicación 1: técnica indirecta". Para la técnica directa use Coltène Gi-MASK C-Silikon, n.º de art. 8030.

**Tiempos clínicos**

**≥ 9:00 min (23 °C / 73 °F)**




**Contraindicaciones**
El material no está autorizado para la confección de epítesis.

**Efectos secundarios**
Los polivinilsiloxanos tienen características excelentes de biocompatibilidad; hasta el momento no se conocen efectos secundarios adversos en los usuarios.

**Interacciones**
Las secreciones cutáneas, los guantes de látex y las superficies contaminadas por dichos guantes (dientes, preparaciones, hilos de retracción, etc.) pueden interferir con el proceso de polimerización de los polivinilsiloxanos. Los compuestos con eugenol, así como algunos hemostáticos, también pueden impedir una polimerización perfecta.

**Mezclado y aplicación de GI-MASK Automix *New Formula***
1. Inserte el cartucho lleno de GI-MASK Automix *New Formula* en la placa de retención abierta del dispensador Coltène® de 50 / 75 ml. Cierre la placa de retención.
2. Quite la tapa de seguridad del cartucho.
3. Apriete lentamente el gatillo y expulse una pequeña cantidad de base y de catalizador sobre un papel de celulosa hasta que comprueba que ambos fluyen por igual.
4. Limpie la abertura del cartucho con un papel.
5. Ajuste la boquilla de mezclado (Mixing Tip) sobre el cartucho y gírela un cuarto de vuelta en el sentido de las agujas del reloj para enroscarla.
6. Coloque la tobera de aplicación (Oral Tip) sobre la punta de mezclado.
7. Expulse el material accionado del gatillo.
8. Después de usar el cartucho, no retire la boquilla de mezclado. De este modo, el cartucho queda sellado hasta su siguiente uso, y se evitan contaminaciones cruzadas.
9. No quite la boquilla de mezclado hasta reemplazar mientras de utilizar el dispositivo de nuevo.

**Aplicación 1: técnica indirecta**
1. Elabore una llave de silicona (p.ej. con Coltène® Lab-Putty) que cubra todas las zonas del modelo sin serrar que deban reproducirse.
2. Reduzca con una fresa para escayola las zonas del modelo maestro que vayan a reproducirse con GI-MASK Automix *New Formula*.
3. Realice varios orificios de inyección en el molde de silicona desde palatino / lingual. Para evitar una elevación de la masa gingival, realice también canales de ventilación en el molde desde vestibular / labial.
Es importante que los orificios se encuentren en las zonas preparadas.
4. Rocíe uniformemente toda la superficie de la llave preparada (p.ej. Coltene Lab-Putty) con Gi-MASK Universal Separator y deje que se seque durante un mínimo de 5 minutos.
5. A continuación, colóquela sobre el modelo serrado y tallado y fíjela bien.
6. Inyecte en la llave Gi-MASK Automix *New Formula* con la boquilla de mezclado y la punta de aplicación colocada en el primer orificio (p.ej. por palatino / lingual), hasta que salga material por el orificio opuesto (vestibular). Continúe con el segundo orificio (por palatino / lingual), etc.
7. GI-MASK Automix *New Formula* polimeriza en aproximadamente 9 minutos a partir del inicio de la mezcla.
En cuanto el material haya polimerizado puede desprenderse la llave del modelo.
8. Corte con un bisturí las zonas retentivas presentes a los canales de entrada y salida, y separe la máscara GI-MASK Automix *New Formula* de la llave.
9. Elimine cualquier exceso de material con unas tijeras finas, un bisturí o un instrumento rotatorio para silicona (p.ej. Recortador para siliconas, n.º de art. 8075).
10. Ahora, la máscara gingival puede separarse del modelo maestro y reponerse con toda facilidad.

**Calidad y conservación**
GI-MASK Automix *New Formula* cumple la finalidad prevista al menos hasta la fecha de caducidad indicada en los envases, siempre que éstos se mantengan bien cerrados. El material debe conservarse a temperatura a temperatura ambiente, evitando el calor y la luz solar directa.

**Identificación**
La fecha de caducidad y el número de Lot se indican en los envases.

**Características técnicas según la norma ISO 4823**
Las mediciones se realizaron a una temperatura ambiente de 23 °C / 73 °F y una humedad relativa del 50 %. Los tiempos son menores con temperaturas más altas y mayores con temperaturas más bajas).

| | |
|---|---|
| Tiempo de mezcla: | 0:15 min |
| Tiempo total de trabajo: | 3:00 min |
| Recuperación tras deformación: | 99,8 % |
| Deformación bajo presión: | 5,1 % |
| Modificación dimensional lineal: | -0.2 % |

El producto sólo debe venderse a odontólogos y laboratorios de prótesis, o por orden de estos.

**Fecha de edición de las instrucciones**
06-2018

## Instruções de utilização — PT

**Definição**
GI-MASK Automix *New Formula* é uma masa de moldagem dental tixotrópica e estável, de viscosidade média, com base em silicone A, com dispositivo de mistura automática, para a criação de gengivas artificiais extra-orais no laboratório dentário.

**Tipo de material**
Polivinilsiloxano, silicone de adição.
Base: rosa
Catalisador: branco
ISO 4823, Tipo 2, medium consistency.

**Indicações**
- Reconstrução rápida e precisa do contorno completo da área gengival em volta da preparação no modelo mestre. Particularmente adequado para coronas unitárias, pontes, implantes, trabalhos combinados e telescópicos.
- Para a técnica de implante, a viscosidade específica permite a moldagem rápida e directa dos análogos. Evita deste modo a necessidade de criar uma chave de silicone (por exemplo, de Coltene® Lab-Putty) não é necessária.
- Para impressões de poliéter: Indicação com a técnica indirecta descrita em "Aplicação 1: Técnica indirecta". Para a técnica directa, utilize Coltene Gi-MASK *Silicone de condensação*, Art. Nº 8030.

**Tempos de trabalho clínico**

**≥ 9:00 min (23 °C / 73 °F)**




**Contra-indicações**
O material não é autorizado para a confecção de epíteses.

**Efeitos secundários**
Os polivinilsiloxanos apresentam uma compatibilidade biológica excelente. Até ao momento não há conhecimento de efeitos secundários provocados no utilizador.

**Interacções**
As secreções da pele, luvas de látex e superfícies contaminadas por luvas de látex podem influenciar o processo de presa dos polivinilsiloxanos. Também os preparados contendo eugenol ou determinados preparados para estancar o sangue podem impedir uma presa completa.

**Mistura e aplicação de GI-MASK Automix *New Formula***
1. Insira o cartucho de GI-MASK Automix *New Formula* na tampa de fixação aberta do dispensador Coltène® de 50 / 75 ml. Cierre la placa de retención.
2. Retirar a tampa de segurança do cartucho.
3. Pressione o êmbolo de pressão e esperem um pouco de material sobre um pano de papel, até
a base e o catalisador saírem da abertura uniformemente.
4. Limpar a abertura do cartucho com um pano.
5. Assentar o bico de mistura (mixing tip) na abertura do cartucho e fixá-lo dando ½ de volta no sentido dos ponteiros do relógio.
6. Assentar o tip de aplicação (oral tip) no bico de mistura.
7. Esprema o material por uma actuação uniforme do manipulo de pressão.
8. Depois do uso não tirar o bico de mistura. Este serve como fecho até à utilização seguinte, evitando assim a contaminação do material.
9. Antes do uso seguinte, tirar o bico de mistura e substituí-lo por um novo.

**Aplicação 1: Técnica indirecta**
1. Criar uma chave de silicone (por exemplo, de Coltène® LabPutty) que cobre todas as áreas do modelo não serrado que se pretendem reproduzir.
2. As áreas do modelo mestre que se pretendem reconstruir pelo GI-MASK Automix *New Formula* devem ser reduzidas com uma fresa de gesso.
3. Na área palatino-lingual da chave de silicone fabricar um ou vários furos de injecção. Para evitar a subida da gengiva artificial, abrir adicionalmente canais de saída na área bucco-labial. É importante que os furos se encontrem na área preparada.
4. Pulverize toda a superfície da chave preparada (p.ex. Coltene Lab Putty) de forma regular com Gi-Mask Universal Separator e deixe secar pelo menos 5 minutos.
5. A seguir, assentar e fixar no modelo serrado e desgastado.
6. Injecte GI-MASK Automix *New Formula* e a tipa de aplicação colocada. injectar GI-MASK Automix *New Formula* na chave, no primeiro furo (por exemplo, palatino-lingual), até o material sair no furo oposto (bucal). Continuar com o segundo furo (palatino-lingual) etc.
7. GI-MASK Automix Nova Fórmula secará em aproximadamente 9 minutos, desde o início da mistura.
Logo que o GI-MASK Automix *New Formula* esteja endurecido, a chave pode ser retirada do modelo.
8. Cortar as retenções na área dos canais de entrada e saída com um bisturi e tirar o GI-MASK Automix *New Formula* da chave.
9. Remova o material excedente com tesoura fina, bisturi ou um instrumento rotativo para silicones (p.ex. Aparador para silicones, Art. Nº 8075).
10. A gengiva artificial pode ser agora facilmente removida do modelo mestre e recolocada.

**Aplicação 2: Técnica directa**
1. Limpar e desinfectar o modelo seguindo as instruções do fabricante.
2. Pulverize toda a impressão de forma regular com Gi-Mask Universal GIMASK e seque-a com jacto de ar no mínimo por 5 minutos. Injecte GI-MASK Automix Nova Fórmula directamente na impressão.
3. Injectar o GI-MASK Automix *New Formula* directamente no molde. Por meio do tip de aplicação aplicar em volta dos modelos análogos (implantologia) uma altura aproximada de 5 mm.
4. Aguarde que a GI-MASK Automix Nova Fórmula seque em cerca de 9 minutos, desde o início da mistura.
5. A seguir, encher o molde com gesso dental.
6. Depois do endurecimento retirar o molde cuidadosamente do modelo.
7. Remova o material excedente com tesoura fina, uma faca ou um instrumento rotativo para silicones (p.ex. Aparador para silicones, Art. Nº 8075).
8. A gengiva artificial pode ser agora facilmente removida do modelo mestre e recolocada.

**Durabilidade e armazenamento**
GI-MASK Automix *New Formula* cumpre a sua função pelo menos até à data de expiração que consta nas embalagens, desde que estas estejam bem fechadas. O material deve ser guardado a temperatura ambiente normal. Evitar calor e incidência solar direta.

**Marcação**
A data de expiração e o número do Lot são visíveis nas embalagens.

**Dados técnicos em conformidade com a norma ISSO 4823**
As medições foram realizadas a uma temperatura ambiente de 23 °C / 73 °F e uma humidade relativa de 50%. (Temperaturas mais elevadas reduzem os tempos, enquanto temperaturas mais baixas os prolongam).

| | |
|---|---|
| Tempo de mistura: | 0:15 min |
| Tempo de trabalhabilidade: | 3:00 min |
| Resilência após deformação: | 99,8 % |
| Deformação sob pressão: | 5,1 % |
| Alteração dimensional linear: | - 0,2 % |

Entrega só a dentistas e laboratórios dentais ou em nome destes.

**Edição deste folheto informativo**
06-2018

## Gebruiksaanwijzing — NL

**Definitie**
GI-MASK Automix *New Formula* is een middelvloeibare thixotroop en stabiel dentaal afdrukmateriaal op A-silicoonbasis met automatische menginrichting voor het maken van extraorale tandvleesmaskers in tandheelkundige laboratoria.

**Materiaaltype**
Polyvinylsiloxaan, additie-verhardend silicone.
Basis: roze
Catalysator: wit
ISO 4823, Typ 2, medium body consistency.

**Toepassing**
- Snelle en nauwkeurige reconstructie van het gehele gingivaverloop in het preparatiegebied op het moedermodel, vooral bij afzonderlijke kronen, bruggen, implantaten, combinatie- en telescopische werkzaamheden.
- Bij de implantaatreconstructie maakt de bijzondere viscositeit een snel, direct omspuiten van de modelanalogen mogelijk. Het is daarom niet nodig een siliconesleutel (bijv. gemaakt van Coltène® Lab-Putty) te vervaardigen.
- Voor polyetherdrukken: indicatie met de indirecte techniek beschreven onder "Applicatie 1: Indirecte technieK*".* Gebruik voor de directe techniek Coltène Gi-MASK C-silicone, art.nr. 8030.

**Klinische werktijden**

**≥ 9:00 min (23 °C / 73 °F)**

**Contra-indicaties**
Het is niet toegestaan het materiaal voor het vervaardigen van epithesen te gebruiken.

**Bijwerkingen**
Polyvinylsiloxanen kennen zich door een zeer goede biologische verdraagzaamheid. Tot nu toe zijn geen schadelijke bijwerkingen bij de gebruiker bekend.

**Wisselwerkingen**
Huidsecreties, Latex-handschoenen en door Latex-handschoenen besmette oppervlakken kunnen het uitharddingsproces van polyvinylsiloxanen beïnvloeden. Tevens kunnen eugenolhoudende en bepaalde bloedstollende preparaten een volledige uitharding verhinderen.

**Mengen en aanbrengen van GI-MASK Automix *New Formula***
1. Het patroon met GI-MASK Automix *New Formula* in de geopende fixierklep van de 50 / 75 ml Coltène® dispenser plaatsen en fixierklep sluiten.
2. De veiligheidsdeksel van het patroon verwijderen.
3. De drukknop indrukken en een kleine hoeveelheid materiaal op een papieren doek spuiten totdat basis en catalysator gelijkmatig uit de opening komen.
4. De patroonopening met een doek afwegen.
5. De mengtip (Mixing Tip) op de patroonopening plaatsen en met een kwartslag in de wijzerzin van de klok mee vastdraaien.
6. De applicatietip (Oral Tip) op de mengtip plaatsen.
7. Door gelijkmatige bediening van de drukknop het materiaal eruit persen.
8. Na het gebruik de mengtip niet verwijderen. Deze dient als afsluitdop tot aan volgend gebruik en voorkomt besmetting van het materiaal.
9. Vervolgens voorafgaand aan het opnieuw gebruikt de mengtip en verwarig deze door een nieuwe.

**Gebruik 1: Indirecte techniek**
1. Een siliconesleutel (bijv. van Coltène® Lab-Putty) maken, die alle te reproduceren plaatsen van het ongespaten model bedekt.
2. De plaatsen van het moedermodel, die door GI-Mask Automix *New Formula* moeten worden weergegeven, met een gipsfrees verkleinen.
3. In het palatinale/linguale gebied van de siliconesleutel één of meerdere inspuitopeningen maken. Om een verhoging van het tandvleesmasker te voorkomen, tevens uitloopkanalen in het labiale/buccale gebied maken.
Het is belangrijk dat de openingen zich in het geprepareerde gebied bevinden.
4. Spuit het gehele oppervlak van de geprepareerde sleutel (bijv. Coltene Lab-Putty) gelijkmatig met GI-Mask Universal Separator en droog het gedurende ten minste 5 minuten.
5. Aansluitend op het model aanbrengen en fixeren.
6. Injecteer GI-MASK Automix *New Formula* met de mengtip en geplaatste applicatietip bij de eerste opening (bijv. palatinaal / linguaal) in de sleutel totdat materiaal tot aan de tegenoverliggende opening (buccaal) weer materiaal naar buiten komt. Bij de tweede opening (palatinaal / linguaal) doorgaan, etc.
7. GI-MASK Automix *New Formula* hardt uit in ca. 9 minuten, vanaf het begin van de menging.
Zodra de GI-MASK Automix *New Formula* is uitgehard, kan de sleutel van het model worden losgemaakt.
8. De retenties nabij de in- en uitstroomkanalen met een scalpel doorsnijden en GI-MASK Automix *New Formula* van de sleutel losmaken.
9. Verwijder overtollig materiaal met een fijne schaar of een roterend instrument dat geschikt is voor siliconen (bijv. Trimmer for silicones, art. nr 8075).
10. Het tandvleesmasker kan nu eenvoudig van het moedermodel verwijderd en weer geplaatst worden.

**Gebruik 2: Directe techniek**
1. De afdruk volgens de instructies van de fabrikant reinigen en desinfecteren.
2. Spuit de gehele afdruk met GI-MASK Universal Separator en droog het met lucht gedurende ten minste 5 minuten.
3. GI-MASK Automix *New Formula* direct in de afdruk inspuiten. Via de applicatietip wordt de implantaatanalog (implantaatkop) – ca. 5 mm hoog – aangedrukt.
4. Wacht totdat GI-MASK Automix *New Formula* is uitgehard; dit duurt ca. 9 minuten, vanaf het begin van de menging.
5. Gietuitslag de afdruk met dentaalgips uitgieten.
6. Na het uitharden de afdruk zorgvuldig van het model losmaken.
7. Verwijder eventueel overtollig materiaal met een fijne schaar, een chirurgisch mes of een roterend instrument dat geschikt is voor siliconen (bijv. Trimmer for silicones, art.nr. 8075).
8. Het tandvleesmasker kan nu eenvoudig van het moedermodel verwijderd en weer op model geplaatst worden.

**Moudbaarheid en bewaren**
GI-MASK Automix *New Formula* kan voor het bestemde doel ten minste tot en met de uiterste gebruiksdatum die op de verpakking is vermeld, en bij goed gesloten verpakkingen bewaard worden. Het materiaal moet voor normale kamertemperatuur worden bewaard. Hitte en direct zonlicht moeten worden vermeden.

**Markering**
De uiterste gebruiksdatum en het Lot-nummer zijn vermeld op de verpakking.

**Technische gegevens volgens ISO 4823**
De metingen werden bij 23 °C / 73 °F omgevingstemperatuur en 50 % relatieve vochtigheid uitgevoerd. (Hogere temperaturen verkleinen, lagere temperaturen vergroten de tijden).

| | |
|---|---|
| Mengtijd: | 0:15 min |
| Totale verwerkingstijd: | 3:00 min |
| Herstel na vervorming: | 99,8 % |
| Vervorming onder druk: | 5,1 % |
| Lineaire dimensieverandering: | - 0,2 % |

Leverings uitsluitend aan tandartsen en tandtechnische laboratoria of in hun opdracht.

**Uitgifedatum van deze handleiding**
06-2018

## Brugsanvisning — DA

**Definition**
GI-MASK Automix *New Formula* er et medium flydende, tixotropt og stabilt dentalaftryksmaterale på A-silikonebasis med automatisk blandeanordning til fremstilling af extraorale tandkødsmasker i dentallaboratorier.

**Materialetype**
Polyvinylsiloxan, A-silikon.
Basis: rosa
Katalysator: hvid
ISO 4823, Typ 2, medium body consistency.

**Anvendelsesområde**
- Hurtig og nøjagtig rekonstruktion af hele gingivaforløbet i præparationsområdet på mestermodellen, især ved enkeltkroner, broer, implantater, kombinations- og teleskopopbejdsler.
- Ved implantatteknik muliggør den særlige viskositet en hurtig direkte applicering omkring den analoge model. Der er således ikke nødvendighed at fremstille en silikonenøgle (fx af Coltène® Lab-Putty).
- Til polyether-aftryk: Indikation med indirekte teknik, beskrevet under "Applicering nåsta användning efter". Til indirekte teknik bør der anvendes Coltène GI-MASK C-silikon, art.nr. 8030.

**Klinske arbejdstider**

**≥ 9:00 min (23 °C / 73 °F)**

# G-MASK AUTOMIX
*New Formula*

4. Îndepărtați ortez urme de contaminare cu un prosop.
5. Așezați vârful de amestecare la cartușul și rotiți-l cu ¼ de rotație în sens orar, pentru a-l fixa la locul său.
6. Așezați vârful aplicator pe vârful de amestecare.
7. Scoateți materialul trăgând declanșatorul.
8. Nu îndepărtați vârful de amestecare după utilizarea cartușului. Acesta sigilează cartușul până când este utilizat din nou și previne contaminarea încrucișată.
9. Scoateți vârful de amestecare imediat înainte unei noi utilizări a dispozitivului.

## Aplicarea 1: Tehnica indirectă

1. Controlați o formă prin crearea unui nivelș în jurul tuturor părților modelului care trebuie mascate, cu ajutorul unei silicon de laboratorie (de ex. Coltène® Lab-Putty).
2. Îndepărtați prin frecare un strat de material în acele zone care trebuie modelate cu G-MASK Automix *New Formula*.
3. Tăiați mai multe orificii de injecție în forma de silicon, dinspre partea palatinală și lingurală. Pentru a evita o creștere a măștii gingivale, frezați de asemenea orificii de ventilare în formă, dinspre partea bucală/labială. (Este important să amplasați orificile pe zonele pregătite).
4. Pulverizați uniform pe întreaga suprafață a sablonului preparat (de ex. Coltène® Lab-Putty) Separator universal G-MASK și uscați la aer timp de cel puțin 5 minute.
5. Apoi poziționați pe modelul secționat și ajustat.
6. Țineți mâna fixată pe locul său. Începeți injectarea materialului cu vârful de amestecare și aplicare în primul orificiu (de ex. pe partea palatinală/lingurală) până când materialul Coltène® G-MASK Automix *New Formula* ieșe din orificiul în partea opusă (bucală). Continuați cu al doilea orificiu (pe partea palatinală/lingurală) și apoi mai departe.
7. G-MASK Automix *New Formula* va face prizăin aproximativ 9 minute de la începerea amestecării. Imediat după ce materialul G-MASK Automix *New Formula* a făcut priză, îndepărtați cu grijă mărțica de pe model.
8. Tăiați rezultatele din zona ducturilor de intrare și de ieșire și îndepărtați G-MASK Automix *New Formula* de pe matrice cu ajutorul unei scalpele.
9. Îndepărtați orice surplus de material cu foarfece fine, un bisturiu chirurgical sau un instrument rotativ pentru siliconi (de ex. Trimmer pentru siliconi, nr. art. 8075).
10. Masa gingivală poate fi îndepărtată acum cu ușurință de pe model și repozиționată.

## Aplicarea 2: Tehnica directă

1. Clătiți amprenta sub jet de apă curățătoare cilindată, curățați-o și dezinfectați-o.
2. Pulverizați uniform pe întreaga amprentă Separator universal G-MASK și uscați la aer timp de cel puțin 5 minute. Injectați G-MASK Automix *New Formula* direct în amprentă.
3. Aplicați cu seringa în jurul modelului analog (implantologie) până la 5 mm, cu ajutorul vârfului de aplicare.
4. Așteptați până când G-MASK Automix *New Formula* a făcut priză în circa 9 minute de la începerea inserției.
5. Umpleți amprenta cu gips.
6. După ce ghipsul a făcut priză, îndepărtați cu atenție materialul de pe model.
7. Îndepărtați orice surplus de material cu foarfece fine, un bisturiu chirurgical sau un instrument rotativ pentru siliconi (de ex. Trimmer pentru siliconi, nr. art. 8075).
8. Masa gingivală poate fi îndepărtată acum cu ușurință de pe model și repozиționată.

## Termen de valabilitate și depozitare

G-MASK Automix *New Formula* este adecvat pentru destinația de utilizare cel puțin până la data expirării care este înscrisă pe ambalaj. A se păstra în recipientul original în stare închisă. Materialul trebuie păstrat la temperatura camerei, evitând expunerea la lumina directă a soarelui sau la alte surse de căldură.

## Marcaj

Data expirării și numărul de serie sunt înscrise pe ambalaj și pe cartușe.

## Date tehnice ISO 4823

Măsurătorile se bazează pe o temperatură a camerei de 23°C/73°F și o umiditate relativă de 50%. (Temperaturile mai ridicate scurtează timpii, iar temperaturile scăzute îi prelungesc)

| | |
|---|---|
| Timp de amestecare: | 00:15 min |
| Timp total de lucru: | 3:00 min |
| Reziistență după deformare: | 99,8% |
| Încercarea la compresiune: | 5,1% |
| Modificarea dimensională: | -0,2% |

Furnizat numai medicilor stomatologi și laboratoarelor dentare sau la indicația acestora.

## Data publicării
06-2018

## Instrucțiuni utilizare — PL

## Definicja
GI-MASK Automix *New Formula* jest średniej lepkości, tiksotropowa, zachowującą wymiary, stomatologiczną masą wyciskową na bazie silikonu addycyjnego, przeznaczoną do stosowania w stomatologii z urządzeniem do automatycznego mieszania w celu tworzenia masek dziąsłowych w laboratoriach dentystycznych.

## Rodzaj materiału
Polivinylsiloksan, elastomer silikonowy typu addycyjnego.
Baza: kolor różowy
Katalizator: kolor biały
ISO 4823, typ 0, średnia konsystencja (medium body).

## Wskazania
- Szybka i dokładna rekonstrukcja całego konturu dziąseł wokół preparacji na modelu. Nadaje się w szczególności do pojedynczych koron, mostów, implantów, prac łączonych i teleskopowych.
- W technikach implantów możliwa jest szybka i bezpośrednia aplikacja analogu modelu dzięki specjalnej lepkości. Tego rodzaju nie jest już konieczne wykonywanie klucza Lab Putty (np. Coltène® Lab-Putty).
- Do wycisków pośrednich wskazanie w technice pośredniej jest opisane w punkcie „Aplikacja 1: Technika pośrednia". Do technikі bezpośredniej należy stosować Coltène G-Mask C-Silicone, nr art. 8030.

## Czas kliniczny

**≥ 9:00 min (w temperaturze 23 °C / 73 °F)**

## Przeciwwskazania
Materiału nie można stosować do epitezy.

## Działania niepożądane
Polivinylsiloksany charakteryzują się bardzo dobrą biokompatybilnością. Nie stwierdzono szkodliwego działania ani efektów ubocznych u użytkowników.

## Oddziaływanie z innymi środkami
Wydzielina skórna, rękawiczki lateksowe i powierzchnie skażone rękawiczkami lateksowymi zepchę, mięsica preparacji, inicі retrakcyjne itp.) mogą negatywnie wpłynąć na proces utwardzania polivinylsiloksanu. Powierzchnie zanieczyszczone eugenol lub substancje hemostatyczne mogą również hamować proces idealnego utwardzania.

## Mieszanie i aplikacja G-MASK Automix *New Formula*

1. Włożyć wkład wypełniony produktem GI-MASK Automix *New Formula* do otwartej płytki przytrzymującej 50/75 ml dozownika Coltène® Dispenser. Zamknąć płytkę przytrzymującą.
2. Zdjąć nasadkę wkładu.
3. Powoli naciznąć wyzwalacz i wydzielić małą ilość bazy i katalizatora na kawałek rzemika papierowego, aż będzie widoczne, że baza i katalizator wydostają się w równych ilościach.
4. Usunąć wszelkie zanieczyszczenia ręcznikiem.
5. Osadzić na wkładzie końcówkę mieszającą i obrócić ją o ¼ obrotu w prawo w celu zablokowania.
6. Korkowiąc aplikatora umieścić na końcówce mieszającej.
7. Wydzielić materiał poprzez pociągnięcie wyzwalacza.
8. Po użyciu wkładu nie zdejmować końcówki mieszającej. Dzięki temu wkład jest szczelnie zamknięty aż do następnego użycia i zapobiega to skażeniu krzyżowemu.
9. Końcówkę mieszającą usuwać bezpośrednio przed kolejnym użyciem.

## Aplikacja 1: Technika pośrednia

1. Wykonać odlew poprzez wytworzenie wału między wszystkimi tymi częściami modelu, które mają być odtworzone na masce, używając do tego silikonu laboratoryjnego (np. Coltène® Lab-Putty).
2. Odszlifować warstwę materiału w tych obszarach, które mają być modelowane w G-MASK Automix *New Formula*.
3. Wyciąć kilka otworów do wstrzykiwania w odlewie silikonowym od strony podniebiennej i przygęzykowej. W celu uniknięcia zwiększenia maski dziąsłowej należy również wywiercić odpowietrzniki w odlewie od strony policzkowej/wargowej. (Ważne jest umieszczanie otworów na przewarzonych obszarach.)
4. Równomiernie rozpylić produkt GI-MASK Universal Separator na całej powierzchni przygotowanego kłucza (np. Coltène® Lab-Putty) i suszyć powietrzem przez co najmniej 5 minut.
5. Następnie umieścić na przekrojonym i skropionym modelu.
6. Matrycę należy utrzymywać bezpiecznie na miejscu. Rozpocząć wstrzykiwanie materiału za pomocą końcówki aplikacyjnej i mieszającej do pierwszego otworu (np. strona podniebienna/przygęzykowa), aż materiał Coltène® G-MASK Automix *New Formula* będzie się wydostawać z otworu po przeciwnej stronie (policzkowej). Kontynuować z drugim otworem (strona podniebienna/przygęzykowa) itd.
7. G-MASK Automix *New Formula* utwardzi się w ciągu około 9 minut od rozpoczęcia mieszania. Po utwardzeniu GI-MASK Automix *New Formula* ostrożnie zdjąć matrycę z modelu.
8. Wyciąć rezterwę w obszarze przewodów wlotowych i wylotowych i podnieść skalpelem GI-MASK Automix *New Formula* z matrycy.
9. Usunąć nadmiar materiału precyzyjnymi nożyczkami, nożem chirurgicznym lub instrumentem obrotowym do silikonów (np. Trimmer do silikonów, nr art. 8075).
10. Maskę dziąsłową można teraz łatwo zdjąć z modelu i repozycjonować.

## Aplikacja 2: Technika bezpośrednia

1. Wycisk przepłukać pod bieżącą, letnią wodą, oczyścić i zdezynfekować.
2. Równomiernie rozpylić na całym wyciску produkt GI-MASK Universal Separator i suszyć powietrzem przez co najmniej 5 minut. Wstrzykнąć GI-MASK Automix *New Formula* bezpośrednio do wycisku.
3. Nastrzykiwać wokół analogu modelu (implantologia) do 5 mm przy użyciu końcówki aplikacyjnej.
4. Poczekać, aż GI-MASK Automix *New Formula* utwardzi się w ciągu około 9 minut od rozpoczęcia mieszania.
5. Zalać wycisk gipsem.
6. Po utwardzeniu gipsu ostrożnie zdjąć materiał z modelu.
7. Usunąć nadmiar materiału precyzyjnymi nożyczkami, nożem chirurgicznym lub instrumentem obrotowym do silikonów (np. Trimmer do silikonów, nr art. 8075).
8. Maskę dziąsłową można teraz łatwo zdjąć z modelu i repozycjonować.

## Okres przydatności do użycia i przechowywanie
GI-MASK Automix *New Formula* można używać zgodnie z przeznaczeniem przynajmniej aż do terminu ważności, podanego na opakowaniu. Przechowywać w szczelnie zamkniętych pojemnikach. Materiał należy przechowywać w temperaturze pokojowej, unikając narażenia na działanie bezpośredniego naśłonecznienia lub innych źródeł ciepła.

## Oznakowanie
Termin ważności i numer serii znajdują się na opakowaniu.

## Dane techniczne ISO 4823
Pomiary zostały przeprowadzone pokojowej 23 °C/73 °F i przy względnej wilgotności 50%. (wyższe temperatury skracają, a niskie temperatury wydłużają czas)

| | |
|---|---|
| Czas mieszania: | 00:15 min |
| Całkowity czas pracy: | 3:00 min |
| Odporność po deformacji: | 99,8 % |
| Odkształcenie po ściskaniu: | 5,1 % |
| Zmiana wymiarów: | -0,2 % |

Sprzedaż wyłącznie lekarzom dentystom i laboratoriom dentystycznym lub na ich zlecenie.

## Data publikacji
06-2018

## Instrukcja użycia — CS

## Popis
*G-MASK Automix New Formula* je tixotropní a rozměrově stabilní dentální otiskovací materiál střední viskozity na bázi A-silikonu určený k použití v zubním lékařství s automatickým mícháním zařízením pro výrobu gingiválních masek v zubních laboratořích.

## Typ materiálu
Polyvinylsiloxan, silikonový elastomer adičního typu.
Báze: růžová
Katalyzátor: bílý
ISO 4823, typ 2, střední konzistence.

## Indikace
- Rychlá a přesná rekonstrukce celého obrysu dásní kolem preparace na modelu. Materiál je vhodný zejména pro samostatné korunky, mosty, implantaty, kombinované a teleskopické prvky.
- V případě implantologických technik je díky speciální viskozitě materiál rychlý a přesný umožňuje modelovací analogu. Z tohoto důvodu již není nutná výroba laboratorních lišin (např. Coltène® Lab Putty).
- Pro pořizovací otisky: Indikace pro nepřímou techniku jsou popsány v části „Postup III: 1: Nepřímá technika". Pro přímou techniku použijte C-silikon Coltène G-Mask, dl. č. 8030.

## Klinický čas

**≥ 9:00 min [při 23 °C / 73 °F]**

## Kontraindikace
Tento materiál nelze používat pro epitézy.

## Nežádoucí účinky
Polyvinylsiloxany mají velmi dobrou biologickou kompatibilitu a až do současné doby nejsou známy žádné škodlivé reakce nebo sekundární účinky na uživatele.

## Interakce
Kožní sekrety, latexové rukavice a povrchy kontaminované těmito rukavicemi (zuby, preparace, retrakční vlákna atd.) mohou narušovat proces tuhnutí polyvinylsiloxanů. Dokonale očistěné mohou rovněž narušovat tuhnutí polyvinylsiloxanů eugenol nebo hemostatické látky.

## Míchání a použití materiálu G-MASK Automix *New Formula*

1. Vložte kartuši naplněnou materiálem G-MASK Automix *New Formula* do otevřené fixační desky 50/75ml dávkovače Coltène®. Zavřete fixační desku.
2. Sejměte víčko kartuše.
3. Pomalu mačkejte páčku a vytlačujte malé množství báze a katalyzátoru na papírový ubrousek, dokud nebude zřejmé, že oba vytékají stejně.
4. Případné přebytky z nečistoty odstraňte ubrouskem.
5. Usadte na kartuši míchací hrot a otočte jím o ¼ ve směru hodinových ručiček, aby se v této poloze zajistil.
6. Na míchací hrot nasaďte aplikační hrot.
7. Vytlačte material stisknutím páčky.
8. Po použití kartuše nedobtahujte míchací hrot. Kartuše se tak utěsní do dalšího opětovného použití a zabrání se křížové kontaminaci.
9. Míchací hrot odstraňte teprve přímo před dalším použitím prostředku.

## Použití 1: Nepřímá technika

1. Postavte formu vytvořením bariéry kolem všech částí modelu, které je potřeba vyrýt pomocí laboratorního silikonu (např. Coltène® Lab-Putty).
2. Z oblastí, které se mají modelovat pomocí G-MASK Automix *New Formula*, zbrušte vrstvu materiálu.
3. Z palatinální a lingvální strany vyřízněte do silikonové formy několik vstřikovacích otvorů. Aby nedošlo ke zvýšení gingivální masky, rovněž vyrežte odvětrávací otvory do formy z bukální/labiální strany. (Je důležité, aby se otvory nacházely v preparovaných oblastech).
4. Nastříkejte rovnoměrně celý povrch připravené šablony (např. Coltène® Lab-Putty) přípravkem GI-MASK Universal Separator a nechte jej minimálně po dobu 5 minut vysušit na vzduchu.
5. Poté jej umístěte na ořezaný a obroušený model.
6. Podržte matrici bezpečně na místě. Začněte vstřikovat materiál míchacím a aplikačním hrotem do prvního otvoru (např. z palatinální/lingvální strany), dokud nezačne materiál Coltène® G-MASK Automix *New Formula* vytékat z druhého otvoru (např. z bukální). Pokračujte druhým otvorem (na palatinální/lingvální straně) atd.
7. Materiál G-MASK Automix *New Formula* ztuhne přibližně za 9 minut od počátku míchání. Jakmile materiál G-MASK Automix *New Formula* ztuhne, opatrně sejměte matici z modelu.
8. Odříznete retence v oblasti vstupních a výstupních kanálků a sundejte materiál G-MASK Automix *New Formula* z matrice pomocí skalpelu.
9. Odstraňte veškerý přebytečný materiál nůžkami, chirurgickým nožem nebo rotačním nástrojem na silikony (např. brousek Trimmer na silikony, obj. č. 8075).
10. Gingivální masku lze nyní snadno sejmout z modelu a přemístit.

## Použití 2: Přímá technika

1. Opláchněte otisk tekoucí vlažnou vodou, vyčistěte jej a vydezinfikujte.
2. Nastříkejte rovnoměrně celý otisk přípravkem GI-MASK Universal Separator a nechte jej minimálně po dobu 5 minut zaschnout na vzduchu. Vstřikněte materiál GI-MASK Automix *New Formula* přímo do otisku.
3. Pomocí aplikačního hrotu nastříkejte materiál kolem celého modelového analogu (implantologie) do výše cca 5 mm.
4. Počkejte, dokud materiál GI-MASK Automix *New Formula* neztuhne přibližně za 9 minut od počátku míchání.
5. Vylijte otisk sádrou.
6. Po ztvrdnutí sádry opatrně odstraňte materiál z modelu.
7. Odstraňte veškerý přebytečný materiál nůžkami, chirurgickým nožem nebo rotačním nástrojem na silikony (např. brousek Trimmer na silikony, obj. č. 8075).
8. Gingivální masku lze nyní snadno sejmout z modelu a přemístit.

## Doba použitelnosti a uchovávání
Materiál GI-MASK Automix *New Formula* spňuje zamýšlený účel minimálně do data použitelnosti, které je vytištěno na obalu. Skladujte v dobře uzavřených nádobách. Materiál by se měl skladovat při pokojové teplotě a chraňte jej před působením přímého slunečního světla nebo jiných zdrojů tepla.

## Značení
Datum použitelnosti a číslo šarže jsou uvedeny na obalu a kartuši.

## Technické údaje ISO 4823
Měření jsou založena na pokojové teplotě 23 °C / 73 °F a 50% relativní vlhkosti. (Vyšší teploty urychlené časy zkracují a nižší teploty je naopak prodlužují)

| | |
|---|---|
| Doba míchání: | 0:15 min |
| Celková doba zpracování: | 3:00 min |
| Odnosa po deformaci: | 99,8 % |
| Namáhání v tlaku: | 5,1 % |
| Rozměrová změna: | 0,2 % |

Dodává se pouze zubním lékařům a zubním laboratořím nebo na základě jejich objednávky.

## Datum vydání
06-2018

## Használati utasítások — HU

## Definíció
A GI-MASK Automix *New Formula* egy közepes viszkozitású, A-szilikon bázisú, tixotróp és méretstabil fogászati lenyomatanyag, amely a fogászatban automatikus keverőkészülékkel használható fogínymaszkok készítésére fogászati laboratóriumokban.

## Anyagtípus
Polivinil-sziloxán, adíciós típusú szilikonelasztomer.
Alap: rózsaszín
Katalizátor: fehér
ISO 4823, 2-es típus, közepes anyagsűrűség.

## Javallatok
- A fogköny teljes kontúrjának gyors és pontos rekonstrukciója a mintán a preparáció körül. Kifejezetten megfelelő egyes koronákhoz, hidakhoz, implantátumokhoz, és ötvözött kombinált és teleszkópos munkához.
- Az implantátumokon használt technikák tekintetében a speciális viszkozitás miatt lehetővé vált az analóg modell gyors és közvetlen alkalmazása. (Ily módon Lab Putty szükség nélkül Coltène® Lab-Putty) készítésére már nincs szükség.
- A pontos lenyomatokhoz az indirekt technikára vonatkozó javaslat leírása az „1. alkalmazás: Indirekt technika" című részben található. A direkt technikához használja a Coltène G-Mask C-Silicone anyagot (cikkszám: 8030).

## 1. alkalmazás: Direkt technika

1. Hozzon létre peremet a mintán (részes mazskolni kívánt része körül, és készítsen egy sablont laboratóriumi célokra kifejlesztett szilikon (pl. Coltène® Lab-Putty) használatával.
2. Csiszoljon le egy rétegnyi anyagot azokon a területeken, amelyeket a G-MASK Automix *New Formula* anyaggal kívánt modellezni.
3. Vágjon több befecskendező nyílást a szilikonsablonba a palatinális és a lingvális oldalról. A fogínymaszk megnagyobbodásának elkerülése érdekében fúrjon a sablonba szellőzőnyílásokat is a bukkális/labiális oldalról. (Fontos, hogy a nyílások a kialakított területeken legyenek elhelyezve.)
4. Permetezze be egyenletesen a preparált sablon (pl. Coltène® Lab-Putty) teljes felületét GI-MASK Universal Separator fedőanyaggal, és hagyja a levegőn száradni legalább 5 percig.
5. Ezután helyezze a szekcionált és megformázott mintára.
6. Tartsa a matricát szilárdan a helyén. Kezdje el az anyag befecskendezését a keverő-applikátor csőcsonkjával az egyik nyílásba (pl. a palatinális/lingvális oldalon), amíg a Coltène® G-MASK Automix *New Formula* anyag el nem kezd kifolyni a szemközti (bukkális) oldalon lévő nyílason keresztül. Folytassa a második nyílással (a palatinális/lingvális oldalon), és így tovább.
7. A GI-MASK Automix *New Formula* a keverés kezdete után kb. 9 percen belül megkötött. Amint a GI-MASK Automix *New Formula* megkötött, óvatosan távolítsa el a mintát a mintáról.
8. Vágja ki a retenciókat a bemenet és kimenet ductusok területén, és vegye le a GI-MASK Automix *New Formula* anyagot a mintáról egy szike segítségével.
9. Távolítsa el a felesleges anyagot egy finoman vágó rotációs eszköz, sebészeti késsel vagy szilikonokhoz használatos rotációs eszköz (pl. szilikonokhoz kifejlesztett mintaformázó, cikkszám: 8075) segítségével.
10. A fogínymaszk ezután egyszerűen eltávolítható a mintáról, és áthelyezhető.

## 2. alkalmazás: Direkt technika

1. Öblítse le a lenyomatot folyó vízzel, majd tisztítsa meg és fertőtlenítse.
2. Permetezze be egyenletesen a teljes lenyomatot GI-MASK Universal Separator folyadékkal, és hagyja a levegőn száradni legalább 5 percig. Fecskendezzen be GI-MASK Automix *New Formula* anyagot közvetlenül a lenyomatba.
3. Fecskendezzen anyagot az analóg minta köré (implantológia) legfeljebb 5 mm-ere az applikációs csőcs használatával.
4. Várjon, amíg a GI-MASK Automix *New Formula* a keverés kezdete után kb. 9 percen belül megkötött.
5. Öntsön a lenyomatba gipszet.
6. A gipsz megkötése után óvatosan távolítsa el az anyagot a mintáról.
7. Távolítsa el a felesleg anyagot egy finoman vágó rotációs eszköz, sebészeti késsel vagy egy szilikonokhoz használatos rotációs eszköz (pl. szilikonokhoz kifejlesztett mintaformázó, cikkszám: 8075) segítségével.
8. A fogínymaszk ezután egyszerűen eltávolítható a mintáról, és áthelyezhető.

## Eltarási idő és tárolás
A GI-MASK Automix *New Formula* legalább a csomagoláson feltüntetett lejáratig idő megfelel a rendeltetésének. Tárolja jól lezárt tartályokban. Az anyagot szobahőmérsékleten kell tárolni, és nem szabad kitenni közvetlen napsugárzásnak vagy más hőforrás hatásának.

## Jelölés
A lejárati idő és a gyártási tétel száma fel van tüntetve a csomagoláson és a patronokon.

## Műszaki adatok – ISO 4823
A mérésekre 23 °C/=73 °F és szobahőmérséklet és 50%-os relatív páratartalom mellett került sor. (Magasabb hőmérséklet esetén rövidebb időket, míg alacsonyabb hőmérséklet esetén hosszabb időket kell számolni.)

| | |
|---|---|
| Keverési idő: | 0:15 min |
| Teljes megmunkálási idő: | 3:00 perc |
| Deformálódás utáni regeneráció: | 99,8% |
| Feszültés összenyomás közben: | 5,1% |
| Méretváltozás: | -0,2% |

Csak fogorvosok és fogászati laboratóriumok számára vagy kérésére szállítható.

## Kibocsátás dátuma
06-2018

## Инструкция за употреба — BG

## Дефиниция
GI-MASK Automix *New Formula* представлява стоматологичен средновисоден, несливаем, тиксотропичен отпечатъчен материал на базата на А-силикон, за допълнение с автоматично смесително устройство, предназначен за изработване на гингивални маски в дентални лаборатории.

## Тип материал
Поливинилсилоксан, силиконов еластомер, образуващ мрежеста структура въз основа на реакция на присъединяване.
База: розов цвят
Катализатор: бял цвят
ISO 4823, тип 2, средна консистенция на материала.

## Показания
- Бърза и точна реконструкция на цялостния контур на гингивата около препарацията на модела. Особено подходящ за единични корони, мостове, имплантати, комбинирана и телескопична работа.
- При имплантологичните и вкъмкови бордо и директно приложение на аналогови модели поради специфичния висковитет. Следователно повече не е необходимо изготвянето на калъпи от Lab Putty (напр. Coltène® Lab-Putty).
- За получяване отпечатъци: приложение с описаната индиректна техника, вж. „Приложение 1: Индиректна техника". За директна техника моля използвайте Coltène G-Mask C-Silicone, Kat.№ 8030.

## Клинично време за обработка

**≥ 9:00 min (при 23 °C / 73 °F)**




## Противопоказания
Тоза материал не е предназначен за изработване за епитези.

## Нежелани реакции
Поливинилсилоксените се характеризират с много добра биологична съвместимост. Вредни реакции или вторични ефекти при потребителе не са известни.

## Взаимодействия
Кожна секреция, латексови ръкавици и замърсени от латексови ръкавици повърхности (зъби, препарации, ретракционни кордж и т.н.) могат да нарушават процеса на втвърдяване на поливинилсилоксените. Съдържащи евгенол или хемостатични препарати също могат да въпрепятстват безупречното втвърдяване.

## Смесване и приложение на GI-MASK Automix *New Formula*

1. Вкарайте патлъчникът с GI-MASK Automix *New Formula* картуча в отворената фиксираща пластина на 50/75-милилитровия диспенсър Coltène® Dispenser. Затворете фиксиращата пластина.
2. Свалете капачката на картуча.
3. Стиснете бавно спусъка и изтеглете малкото количество материал върху хартиена кърпа, докато от отвора потекат равномерно база и катализатор.
4. Отстранете с кърпа евентуално замърсяване.
5. Поставете смесителната канюла на картуча и завъртете с ¼ обороти по посока на часовниковата стрелка, за да я фиксирате.
6. Поставете апликационната канюла на смесителната канюла.
7. Изтеглете материал чрез натискане на спусъка.
8. След употребата не картуча не отстранявайте смесителната канюла. Така картуча се запечатва до следващата употреба и се предотвратява кръстосаното замърсяване.
9. Преди следващата употреба сте длъжни да отстраните смесителната канюла. Така се предотвратява допълнителна контаминация при повторната употреба на изделието.

## Приложение 1: Индиректна техника

1. Изгответе силиконова матрица (напр. от Coltène® Lab-Putty), покриваща всичко, което трябва да моделирате.
2. Отстранете слой от материала в участъците, които ще се моделират в G-MASK Automix *New Formula*.
3. Изрежете няколко отвора за инжектиране в палатинален/лингвален участък на силиконовата матрица. За да избегнете поддаване на гингивалната маска поради по-голяма повърхностна площ, изрежете допълнителни вентилиращи отвори в матрицата от бухален/лабиален страна. (Важно е отворите да се намират в препарираната част).
4. Напръскайте равномерно цялата повърхност на подготвената матрица (напр. Coltène® Lab-Putty) с GI-MASK Universal Separator и оставете да изсъхне в продължение на минимум 5 минути.
5. След това позиционирайте върху разделения на секции и подрязан модел.
6. Фиксирайте матрицата стабилно. Инжектирайте Coltène® G-MASK Automix *New Formula* от пистолета и поставете апликационен накрайник в първия отвор (напр. от палатинален/лингвален страна) в матрицата, докато материалът от другата страна на матрицата изтече от другия отвор (напр. бухален). Продължете с втория отвор (палатинален/лингвален страна) и т.н.
7. Остаряе G-MASK Automix *New Formula* да се втвърди в рамките на около 9 минути от началото на смесването. Отстранете внимателно матрицата от модела, веднъж щом G-MASK Automix *New Formula* е втвърдял.
8. Изрежете задръствания в зоната на входовете и изходните канали и повдигнете GI-MASK Automix *New Formula* от матрицата с помощта на скалпел.
9. Отстранете излишния материал с фини ножици, или ротиращ инструмент за силикони (напр. трименр за силикони, кат. № 8075).
10. Сега гингивалната маска може лесно да се извади от модела и да се позиционира отново.

## Приложение 2: Директна техника

1. Изплатете отпечатъка под течаща хладна вода, почистете и дезинфектирайте.
2. Напръскайте равномерно целия отпечатък с GI-MASK Universal Separator и оставете да изсъхне в продължение на минимум 5 минути. Инжектирайте GI-MASK Automix *New Formula* директно в отпечатъка.
3. Шприцовайте на височина до 5 mm около аналоговия модел (имплантология) с помощта на апликационния накрайник.
4. Оставете GI-MASK Automix *New Formula* да се втвърди в рамките на около 9 минути от началото на смесването.
5. Заливете отпечатъка с гипс.
6. След втвърдяването на гипса внимателно отделете отпечатъка от модела.
7. Отстранете излишния материал с фини ножици, скалпел или ротиращ инструмент за силикони (напр. трименр за силикони, кат. № 8075).
8. Сега гингивалната маска може лесно да се извади от модела и да се позиционира отново.

## Срок на годност и съхранение

GI-MASK Automix *New Formula* изпълнява предназначеното си минимум до изтичане на срока на годност, отбелязан на опаковката. Съхранявайте в плътно затворени контейнери. Съхранявайте материала на стайна температура и не го излагайте на пряка слънчева светлина или други източници на топлина.

## Маркировка

Срокът на годност и номерът на партидата са обозначени върху опаковката и картуча.

## Технически данни ISO 4823

Измерванията са извършени при температура на помещението 23 °C/73 °F и 50% относителна влажност. (Високата температура съкращава времето, ниска температура го удължава)

| | |
|---|---|
| Време за смесване: | 0:15 min |
| Общо време за обработка: | 3:00 min |
| Резистентност след деформация: | 99,8 % |
| Деформация под натиск: | 5,1 % |
| Промяна на размера: | -0,2 % |

Достъпи се само на стоматолози и дентални лаборатории или съгласно техните указания.

## Дата на издаване
06-2018

## Lietošanas instrukcija — LV

## Definīcija
GI-MASK Automix *New Formula* ir vidējas viskozitātes tikotropisks un formu saglabājošs zobārstniecības nospiedumu materiāls uz A silikona bāzes, un to paredzēts izmantot zobārstniecības laboratorijās smaganu maksu izveidei automātiskajās sajaukšanas ierīcēs.

## Materiāla veids
Polivinilsiloksāns, piedevas veida, silikona elastomērs.
Bāze: rozā
Katalizators: balts
ISO 4823, 2. tips, vidēja konsistence.

## Indikācijas
- Ātra un precīza pilnu smaganu kontūru rekonstrukcija ap modela sagatavi. Materiāls ir piemērots galvenokārt atsevišķiem kroņiem, tiltiem, implantiem, apvienotiem un teleskopiskiem darbiem.
- Pateicoties īpašai viskozitātei, iespējama ātra un tieša modela analoga izveide ar implanta metodi. Tādēļ vairs nav nepieciešams Lab Putty veidne (piemēram, Coltène® Lab-Putty).
- Pozitīvas nospiedumiem: netiešā metode ir aprakstīta sadaļā "1. Lietošana. Netiešā metode". Tiešajai metodei, lūdzu, izmantot Coltène G-Mask C-Silicone, izstr. nr. 8030.

## Klinikais laiks

**≥ 9 minūtes (23 °C/73 °F)**




## Kontrindikācijas
Šo materiālu nav paredzēts izmantot epitēzēm.

## Blakusparādības
Polivinilsiloksāniem ir ļoti labas bioloģiskās savietojamības raksturlīnes, un nav konstatēti kaitīgi efekti vai blakusēdas ietekmes uz lietotājiem.

## Mijiedarbība ar citām vielām
Izdalījumi no ādas, lateksa cimdi un ar šiem cimdiem piesārņotas virsmas (zobi, sagataves, retrakcijas diegi utt.) var ietekmēšanas ietekmēt polivinilsiloksāna sacietēšanas procesu. Sastāvdaļas, kas satur eigenolu vai hemostātes vielas, arī var nelabvēlīgi ietekmēt sacietēšanu.

## GI-MASK Automix *New Formula* sajaukšana un uzklāšana

1. Ievietojiet GI-MASK Automix *New Formula* dispešķīs kasetni atvērtā 50/75 ml Coltène® dozatora nospieduma plāksnītē. Aizveriet nospieduma plāksnīti.
2. Noņemiet kasetnes vāku.
3. Lēnām saspiediet trigeri un izspiediet nelielu daudzumu bāzes un katalizatora uz papīra drāniņa, līdz redzams, ka tiek izspiests vienāds abu vielu daudzums.
4. Ja pamanāt netīrumus, notīriet tos ar drāniņu.
5. Uzlieciet uz kasetnes jauktāsnas uzgaļi un pagrieziet to par ¼ pulksteņa rādītāju kustības virzienā, lai nostiprinātu.
6. Pievienojiet aplikatora uzgaļi jauktāsnas uzgalim.
7. Izspiediet materiālu, pavelkot trigeri.
8. Pēc kasetnes lietošanas nenoņemiet jauktāsnas uzgaļi. Šādi tiek izveidots kasetnes blīvējums līdz nākamajai lietošanas reizei un novērsts piesārņojums.
9. Jauktāsnas uzgaļi noņemiet tikai tieši pirms ierices nākamās lietošanas reizes.

## 1. Lietošana. Netiešā metode

1. Izveidojiet veidni, izmantojot materiālu ap vīsāmā modeļa daļām, kuras tiks maskētas, izmantojot laboratorijas silikonu (piemēram, Coltène® Lab-Putty).
2. Noslīpējiet materiāla slāni tajās daļās, kura tiks veidotas, izmantojot GI-MASK Automix *New Formula*.
3. Izveidojiet silikona veidnē vairākus injicēšanas caurumus no aukslēju un mēles puses. Lai nepieļautu smaganu maksas palielināšanos, izurbiet veidnē ventilācijas caurumus no aukslēju un mēles puses. (Caurumus varēsi novietot sagatavotajos apgabalos).
4. Vienmērīgi uzsmidzināt uz sagatavotās pamatnes (piemēram, Coltène® Lab-Putty) veidnes GI-MASK Universal Separator un vismaz 5 minūtes žāvējiet ar gaisu.
5. Pēc tam novietojiet uz izveidotā un apgriezta modeļa.
6. Matricai jābūt novietotai stingri tai paredzētajā vietā. Sākt injicēt materiālu primāja caurumā (piemēram, aukslējas/mēles puse), izmantojot jauktāsnas un uzklāšanas uzgaļi, līdz Coltène® GI-MASK Automix *New Formula* materiāls tiek izspiests no cauruma pretējā pusē (bukālajā vai labiālajā pusē) un tā tālāk.
7. Pēc sajaukšanas GI-MASK Automix *New Formula* sacietē aptuveni 9 minūšu laikā. Tīklītē GI-MASK Automix *New Formula* sacietē, piesardzīgi noņemiet matricu no modeļa.
8. Nogriezietizvirzījumus pievades un izvades kanālu apgabalā un izņemiet GI-MASK Automix *New Formula* no matricas, izmantojot skalpeli.
9. Noņemiet visus materiāla pārpalikumus, izmantojot nelielas šķēres, ķirurģijas nazi vai silikonam paredzētu rotējošu instrumentu (piemēram, trimeri silikonam, izstr. nr. 8075).
10. Smaganu masku tagad var viegli noņemt no modeļa un pārvietot.

## 2. Lietošana. Tiešā metode

1. Skalojiet nospiedumu tekošā, remdenā ūdenī. Pēc tam notīriet un dezinficējiet to.
2. Vienmērīgi smidzināt uz sagatavotā nospieduma separatoru GI-MASK Universal Separator un vismaz 5 minūtes žāvējiet ar gaisu. Injicējiet GI-MASK Automix *New Formula* tieši nospiedumā.
3. Injicējiet apkārt modelim analogam (implantoloģija) (ne vairāk par 5 mm), izmantojot uzklāšanas uzgaļi.
4. Uzgaidiet, līdz GI-MASK Automix *New Formula* sacietē. Pēc sajaukšanas sākšanas tas sacietē aptuveni 9 minūšu laikā.
5. Iespiediet nospiedumā ģipsi.
6. Kad ģipsis ir sacietējis, pārslēdziet izņemiet materiālu no modeļa.
7. Noņemiet visus materiāla pārpalikumus, izmantojot nelielas šķ